

УДК 511.72

## Геометрія нескінченно-символьного $q_0^\infty$ -зображення дійсних чисел та її застосування у метричній теорії чисел

Я. В. Гончаренко, І. М. Лисенко

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

АНОТАЦІЯ. Розглядається нова система кодування (зображення) дробової частини дійсного числа:

$$(0; 1] \ni x = q_0^{a_1} + \sum_{n=1}^{\infty} (1 - q_0)^n q_0^{a_1+a_2+\dots+a_{n+1}-n} \equiv \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty},$$

яка має нескінченний алфавіт  $A \equiv N = \{1, 2, 3, \dots\} \ni a_n = a_n(x)$ , нульову надлишковість (кожне число має єдине зображення), залежить від одного параметра  $q_0 \in (0; 1)$  і назване  $q_0^\infty$ -зображенням.

У роботі висвітлюється зв'язок  $q_0^\infty$ -зображення числа  $x$  з його двосимвольним  $Q_2$ -зображенням ( $Q_2 = \{q_0, q_1 \equiv 1 - q_0\}$ ):

$$x = \beta_{\alpha_1(x)} + \sum_{k=2}^{\infty} \left( \beta_{\alpha_k(x)} \prod_{j=1}^{k-1} q_{\alpha_j(x)} \right), \quad \alpha_j(x) \in A_2 \equiv \{0, 1\},$$

$\beta_0 = 0, \beta_1 = q_0$ , яке є узагальненням класичного двійкового зображення і співпадає з ним при  $q_0 = \frac{1}{2}$ ; спростовується гіпотеза про критерій раціональності числа при раціональному  $q_0$ . Описується геометрія  $q_0^\infty$ -зображення (геометричний зміст цифр, властивості циліндричних та хвостових множин, множин чисел, визначених умовами на їхнє  $q_0^\infty$ -зображення тощо). На основі виведених метричних відношень розв'язується ряд метричних задач.

**Ключові слова:** зображення (кодування) числа, геометрія чисел, циліндри, міра Лебега, множини канторівського типу, множини Безиковича-Егглстона.

ABSTRACT. We consider a new system of encoding (representation) of fractional part of real number:

$$(0; 1] \ni x = q_0^{a_1} + \sum_{n=1}^{\infty} (1 - q_0)^n q_0^{a_1+a_2+\dots+a_{n+1}-n} \equiv \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}$$

This system has an infinite alphabet  $A \equiv N = \{1, 2, 3 \dots\} \ni a_n = a_n(x)$ , a zero redundancy (any number has a unique representation), depends on one parameter  $q_0 \in (0; 1)$  and is called  $q_0^\infty$ -representation. In the paper, we establish a relation between  $q_0^\infty$ -representation of number  $x$  and its two-symbol  $Q_2$ -representation ( $Q_2 = \{q_0, q_1 \equiv 1 - q_0\}$ ):

$$x = \beta_{\alpha_1(x)} + \sum_{k=2}^{\infty} \left( \beta_{\alpha_k(x)} \prod_{j=1}^{k-1} q_{\alpha_j(x)} \right), \quad \alpha_j(x) \in A_2 \equiv \{0, 1\},$$

$\beta_0 = 0, \beta_1 = q_0$ . The latter generalizes a classic binary representation and coincides with it if  $q_0 = \frac{1}{2}$ . We reject a conjecture about criterion of rationality of number for rational  $q_0$ . Geometry of  $q_0^\infty$ -representation (geometric meaning of digits, properties of cylindrical and tail sets, and sets of numbers defined by conditions on their  $q_0^\infty$ -representation, etc.) is described. Using obtained metric relations we solve some metric problems.

**Keywords:** representation (encoding) of number, geometry of numbers, cylinders, Lebesgue measure, Cantor-like sets, Besicovitch-Eggleston sets.

## ВСТУП

Сьогодні в математиці розробляються і використовуються різні системи представлення та зображення (кодування) дійсних чисел. Одні з них використовують скінченний [2, 13], інші — нескінченний алфавіт [8, 7]; одні — суттєво надлишкові, інші мають нульову надлишковість; геометрія одних самоподібна, інших — несамоподібна. Потреба в створенні таких систем продиктована різними цілями, однією з яких є забезпечення засобів для моделювання та дослідження математичних об'єктів зі складною локальною будовою (множин, перетворень простору, функцій, мір, динамічних систем тощо).

Серед існуючих систем зустрічаються системи-двійники (наприклад, двійкова і негдвійкова,  $s$ -кова і негд- $s$ -кова, зображення чисел знакододатними і знакозмінними рядами Люрота [3, 14] та ін.), які мають схожу геометрію. Між окремими системами з скінченним та нескінченним алфавітами існує тісний зв'язок.

Дана робота присвячена системі зображення дійсних чисел півінтервалу  $(0; 1]$  з нескінченним алфавітом, яка на пряму пов'язана з відомою двосимвольною системою з алфавітом  $A_2 = \{0, 1\}$ . Обидві системи визначаються єдиним параметром  $q_0 \in (0; 1)$ .

Згадане двосимвольне зображення чисел називається  $Q_2$ -зображенням [12], де  $Q_2 = \{q_0, q_1 = 1 - q_0\}$ . Його суть розкриває наступне твердження: для будь-якого

числа  $x \in [0; 1]$  існує послідовність  $(\alpha_n)$ ,  $\alpha_k \in A_2$ , така, що

$$x = \beta_{\alpha_1} + \sum_{k=2}^{\infty} \left( \beta_{\alpha_k} \prod_{i=1}^{k-1} q_{\alpha_i} \right) \equiv \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \dots}^{Q_2}, \quad (1)$$

де  $\beta_i = iq_{1-i}$ ,  $i = 0, 1$ , тобто  $\beta_0 = 0$ ,  $\beta_1 = q_0$ .

Символічний запис (2) називається  $Q_2$ -зображенням числа  $x$  і ряду (2). Геометрія  $Q_2$ -зображення є самоподібною і добре вивченою [12, 10].

При  $q_0 = \frac{1}{2}$   $Q_2$ -зображення є класичним двійковим записом числа.

У даній роботі ми вивчаємо геометрію нового зображення з нескінченним алфавітом  $A = N$  і екстранульовою надлишковістю (кожне число з півінтервала  $(0; 1]$  має єдине зображення), яке по суті є перекодуванням  $Q_2$ -зображення числа, а також приділяємо увагу проблемі критерія раціональності числа у даному зображенні. В ній розв'язується ряд задач метричного характеру (про міру Лебега та фраткальну розмірність) множин дійсних чисел, визначених різними умовами на їх зображення.

## ВСТУП

Сьогодні в математиці розробляються і використовуються різні системи представлення та зображення (кодування) дійсних чисел. Одні з них використовують скінченний [2, 13], інші — нескінченний алфавіт [8, 7]; одні — суттєво надлишкові, інші мають нульову надлишковість; геометрія одних самоподібна, інших — несамоподібна. Потреба в створенні таких систем продиктована різними цілями, однією з яких є забезпечення засобів для моделювання та дослідження математичних об'єктів зі складною локальною будовою (множин, перетворень простору, функцій, мір, динамічних систем тощо).

Серед існуючих систем зустрічаються системи-двійники (наприклад, двійкова і негадвійкова,  $s$ -кова і негас-кова, зображення чисел знакододатними і знаковмінними рядами Люрота [3, 14] та ін.), які мають схожу геометрію. Між окремими системами з скінченим та нескінченим алфавітами існує тісний зв'язок.

Дана робота присвячена системі зображення дійсних чисел півінтервалу  $(0; 1]$  з нескінченим алфавітом, яка напряду пов'язана з відомою двосимвольною системою з алфавітом  $A_2 = \{0, 1\}$ . Обидві системи визначаються єдиним числом  $q_0 \in (0; 1)$ .

Згадане двосимвольне зображення чисел називається  $Q_2$ -зображенням, де  $Q_2 = \{q_0, q_1 = 1 - q_0\}$  [12]. Його суть розкриває наступне твердження: для будь-якого числа  $x \in [0; 1]$  існує послідовність  $(\alpha_n)$ ,  $\alpha_k \in A_2$ , така, що

$$x = \beta_{\alpha_1} + \sum_{k=2}^{\infty} \left( \beta_{\alpha_k} \prod_{i=1}^{k-1} q_{\alpha_i} \right) \equiv \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \dots}^{Q_2}, \quad (2)$$

де  $\beta_i = iq_{1-i}$ ,  $i = 0, 1$ , тобто  $\beta_0 = 0$ ,  $\beta_1 = q_0$ .

Символічний запис (2) називається  $Q_2$ -зображенням числа  $x$  і ряду (2). Геометрія  $Q_2$ -зображення є самоподібною і добре вивченою [12, 10].

При  $q_0 = \frac{1}{2}$   $Q_2$ -зображення є класичним двійковим записом числа.

### 1. $q_0^\infty$ -ЗОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОГО ЧИСЛА

**Теорема 1.** *Якщо  $(0; 1) \ni q_0$  — фіксоване дійсне число, то для будь-якого  $x \in (0; 1]$  існує єдина послідовність натуральних чисел  $(a_n)$  така, що*

$$x = q_0^{a_1} + \sum_{n=1}^{\infty} (1 - q_0)^n q_0^{a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1} - n} \equiv \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}. \quad (3)$$

*Доведення.* Очевидною є рівність

$$1 = q_0 + (1 - q_0)q_0 + (1 - q_0)^2 q_0 + \dots + (1 - q_0)^n q_0 + \dots = \frac{q_0}{1 - (1 - q_0)},$$

тобто для числа 1 послідовністю  $(a_n)$  є послідовність  $a_n = 1$  для всіх  $n \in \mathbb{N}$ .

Оскільки

$$x \in (0; 1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} (q_0^n; q_0^{n-1}],$$

то очевидно, що існує  $a_1 \in \mathbb{N}$  таке, що

$$x \in (q_0^{a_1}; q_0^{a_1-1}], \quad \text{тобто} \quad q_0^{a_1} < x \leq q_0^{a_1-1}$$

або

$$0 < x - q_0^{a_1} \equiv x_1 \leq q_0^{a_1-1}(1 - q_0).$$

Звідки отримуємо

$$x = q_0^{a_1} + x_1.$$

Аналогічно, оскільки

$$x_1 \in (0; q_0^{a_1-1}(1 - q_0)] = \bigcup_{n=1}^{\infty} (q_0^{a_1+n-1}(1 - q_0); q_0^{a_1+n-2}(1 - q_0)],$$

то існує  $a_2$  таке, що

$$\begin{aligned} x_1 \in (q_0^{a_1+a_2-1}(1 - q_0); q_0^{a_1+a_2-2}(1 - q_0)] &\Leftrightarrow \\ 0 < x_1 - q_0^{a_1+a_2-1}(1 - q_0) \equiv x_2 \leq q_0^{a_1+a_2-2}(1 - q_0)^2. \end{aligned}$$

Звідки

$$x_1 = q_0^{a_1+a_2-1}(1 - q_0) + x_2,$$

а отже,

$$x = q_0^{a_1} + q_0^{a_1+a_2-1}(1 - q_0) + x_2.$$

Продовжуючи цей процес, буде знайдено числа  $a_3, a_4, \dots, a_k$  і  $x_3, x_4, \dots, x_{k-1}, x_k$  такі, що

$$0 < x_{k-1} - q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k-k+1}(1-q_0)^{k-1} \equiv x_k \leq q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k-k}(1-q_0)^k$$

і

$$x = q_0^{a_1} + q_0^{a_1+a_2-1}(1-q_0) + \dots + q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k-k+1}(1-q_0)^{k-1} + x_k.$$

Після чого, міркуючи аналогічно, а саме: оскільки

$$x_k \in \left(0; q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k-k}(1-q_0)^k\right] = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k+n-k}(1-q_0)^k; q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k+n-k-1}(1-q_0)^k\right],$$

то існує  $a_{k+1} \in \mathbb{N}$  таке, що

$$0 < x_k - q_0^{a_1+a_2+\dots+a_{k+1}-k}(1-q_0)^k \equiv x_{k+1} \leq q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k+a_{k+1}-k-1}(1-q_0)^{k+1}.$$

Тому цей процес є нескінченним, але є збіжним, оскільки

$$x_{k+1} \leq q_0^{a_1+a_2+\dots+a_{k+1}-k-1}(1-q_0)^{k+1} \leq (1-q_0)^{k+1} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Отже, має місце розклад (3).

Його єдиність власне є наслідком єдиності кожного  $a_n$ . Дамо незалежне доведення цьому. Для цього припустимо, що має місце

$$x = q_0^{a'_1} + \sum_{n=1}^{\infty} (1-q_0)^n q_0^{a'_1+a'_2+\dots+a'_{n+1}-n} \quad (4)$$

Рівність (4) не співпадатиме з (3), якщо існує  $a_{i+1} \neq a'_{i+1}$ . Не порушуючи загальності вважатимемо, що  $a_{i+1} < a'_{i+1}$ . Тоді розглянемо різницю рівностей (3) і (4)

$$\begin{aligned} 0 = x - x &= q_0^{a_1} + \sum_{n=1}^{\infty} (1-q_0)^n q_0^{a_1+a_2+\dots+a_{n+1}-n} - q_0^{a'_1} - \sum_{n=1}^{\infty} (1-q_0)^n q_0^{a'_1+a'_2+\dots+a'_{n+1}-n} = \\ &= (1-q_0)^i q_0^{a_1+a_2+\dots+a_i-i} \left( q_0^{a_{i+1}} - q_0^{a'_{i+1}} + \right. \\ &\quad \left. + q_0^{a_{i+1}} \sum_{k=2}^{\infty} (1-q_0)^{k-1} q_0^{a_{i+2}+\dots+a_{i+k}-k+1} - q_0^{a'_{i+1}} \sum_{k=2}^{\infty} (1-q_0)^{k-1} q_0^{a'_{i+2}+\dots+a'_{i+k}-k+1} \right) > \\ &> (1-q_0)^i q_0^{a_1+a_2+\dots+a_i-i} q_0^{a_{i+1}} (1-q_0) \left( 1 - \sum_{k=2}^{\infty} (1-q_0)^{k-1} q_0^{a_{i+2}+\dots+a_{i+k}-k+1} \right) > \\ &> (1-q_0)^{i+1} q_0^{a_1+a_2+\dots+a_i+a_{i+1}-i} \left( 1 - \sum_{k=2}^{\infty} (1-q_0)^{k-1} q_0 \right) > 0. \end{aligned}$$

Отримали протиріччя  $0 = x - x > 0$ , яке доводить єдиність і всю теорему.  $\square$

**Означення 1.** Формальний (скорочений) запис  $\Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}$  ряду (3) і числа  $x$  називатимемо його  $q_0^\infty$ -зображенням, яке є його кодуванням засобами нескінченного алфавіту  $A = \{1, 2, \dots\}$ . При цьому число (символ)  $a_n = a_n(x)$  називається  $n$ -ою цифрою (символом) цього зображення, вона є функцією  $x$  (числа, що розкладається (розгортається) в ряд (3)).

**Зауваження 1.** З теореми 1 випливають твердження:

- 1)  $x_1 = x_2$  тоді і тільки тоді, коли  $a_i(x_1) = a_i(x_2)$  для всіх  $i \in \mathbb{N}$ ;
- 2)  $x_1 < x_2$  тоді і тільки тоді, коли існує  $m$  таке, що  $a_m(x_1) > a_m(x_2)$  і  $a_i(x_1) = a_i(x_2)$  при  $i < m$ .

**Зауваження 2.** Розклад числа  $x$  в ряд (3) є  $Q_2$ -зображенням цього числа, яке формально записується

$$x = \Delta_{\underbrace{0 \dots 0}_{a_1-1} \underbrace{1 \dots 0}_{a_2-1} \underbrace{0 \dots 0}_{a_3-1} \underbrace{1 \dots 0}_{a_n-1} \dots}^{Q_2} = \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}. \quad (5)$$

Цей запис встановлює зв'язок (відповідність) між  $Q_2$ -зображенням числа  $x \in (0; 1]$  з двосимвольним алфавітом  $A_2 = \{0, 1\}$  і кодуванням його засобами нескінченно символного алфавіту  $A = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ .

## 2. УМОВИ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ЧИСЛА У ЙОГО $q_0^\infty$ -ЗОБРАЖЕННІ

Якщо  $q_0$  — число раціональне, то  $q_0^\infty$ -зображення називатимемо раціональним  $q_0^\infty$ -зображенням.

**Теорема 2.** Якщо раціональне  $q_0^\infty$ -зображення числа  $x$  є періодичним, то  $x$  — раціональне число.

*Доведення.* Оскільки розклад (3) є  $Q_2$ -зображенням числа  $x$ , то це твердження можна вивести з добре відомого факту: число  $x$  є раціональним, якщо його  $Q_2$ -зображення є періодичним та наступної леми.

**Лема 1.**  $q_0^\infty$ -зображення числа  $x$  є періодичним тоді і тільки тоді, коли його  $Q_2$ -зображення є періодичним.

*Доведення.* Необхідність очевидно випливає з (5).

Доведемо достатність. Нехай  $x$  має періодичне раціональне  $Q_2$ -зображення

$$x = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_m (c_1 c_2 \dots c_p)}^{Q_2}.$$

Якщо  $p = 1$  і  $c_1 = 0$ , то  $\alpha_m = 1$  і

$$x = b_{\alpha_1} q_{\alpha_1} + b_{\alpha_2} q_{\alpha_1} q_{\alpha_2} + \dots + b_{\alpha_{m-1}} \prod_{i=1}^{m-1} q_{\alpha_i} + b_1 \prod_{i=1}^m q_{\alpha_i} =$$

де  $b_0 = 0$ ,  $b_1 = q_0$ . Тоді, використовуючи (5), отримаємо

$$\begin{aligned} x &= q_0^{a_1} + (1 - q_0)q_0^{a_1+a_2-1} + \dots + (1 - q_0)^{k-1}q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k-k+1} + \\ &\quad + q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k-k+1}(q_0(1 - q_0)^k + q_0(1 - q_0)^{k+1} + \dots) = \\ &= q_0^{a_1} + (1 - q_0)q_0^{a_1+a_2-1} + \dots + (1 - q_0)^{k-1}q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k-k+1} + (1 - q_0)^k q_0^{a_1+a_2+\dots+a_k-k+1} = \Delta_{a_1 \dots a_k}^{q_0^\infty(1)}, \end{aligned}$$

де  $k = \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i$ ,  $a_1 + a_2 + \dots + a_j = n$ :  $\sum_{i=1}^n \alpha_i = j$ .

Якщо  $p = 1$  і  $c_1 = 1$ , то  $\alpha_m = 0$  і

$$x = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{m-1} 1(0)}^{Q_2},$$

тобто маємо попередній випадок.

Якщо  $p > 1$ , то в наборі  $(c_1, c_2, \dots, c_p)$  існують як 0, так і 1.

Далі, в разі потреби, для спрощення записів використовуватимемо скорочене позначення  $a_1 + a_2 + \dots + a_k = \tau_k$ .

Тоді знайшовши суму  $c_1 + c_2 + \dots + c_p = q$ , знаходимо числа  $n_1, n_2, \dots, n_q$  такі, що  $c_{n_1} + c_{n_2} + \dots + c_{n_j} = j$ .

Звідки знаходимо  $s_1 = n_1$ ,  $s_2 = n_2 - c_1$ ,  $\dots$ ,  $s_j = n_j - (c_1 + c_2 + \dots + c_{j-1})$ .

Тоді

$$\begin{aligned} x &= q_0^{a_1} + (1 - q_0)q_0^{\tau_2-1} + \dots + (1 - q_0)^{k-1}q_0^{\tau_k-k+1} + (1 - q_0)^k q_0^{\tau_k+s_1-k} + (1 - q_0)^{k+1} q_0^{\tau_k+s_1+s_2-k-1} + \dots + \\ &\quad + (1 - q_0)^{k+q-1} q_0^{\tau_k+s_1+s_2+\dots+s_q-k-q+1} + (1 - q_0)^{k+q} q_0^{\tau_k+2s_1+s_2+\dots+s_q-k-q} + \\ &\quad + (1 - q_0)^{k+q+1} q_0^{\tau_k+2s_1+2s_2+\dots+s_q-k-q} + \dots + (1 - q_0)^{k+2q-1} q_0^{\tau_k+2s_1+2s_2+\dots+2s_q-k-2q+1} + \dots = \\ &= \Delta_{a_1 a_2 \dots a_k (s_1 s_2 \dots s_q)}^{q_0^\infty}, \end{aligned}$$

тобто  $q_0^\infty$ -зображення числа  $x$  є періодичним. □

□

**Наслідок 1.** *Раціональне  $q_0^\infty$ -зображення ірраціонального числа є неперіодичним.*

Виникає питання: чи правильне твердження, обернене до теореми 2?

Відповідь на нього дає наступний контрприклад.

Покажемо, що при  $q_0 = \frac{1}{3}$  число  $x = \frac{1}{2}$  має неперіодичне  $q_0^\infty$ -зображення.

Припустимо супротивне. Нехай  $\frac{1}{2} = \Delta_{a_1 \dots a_k (c_1 \dots c_m)}^{(\frac{1}{3})^\infty}$ , тобто

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= \left(\frac{1}{3}\right)^{a_1} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{a_1+a_2-1} + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{a_1+a_2+\dots+a_k-k+1} + \\ &\quad + \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{a_1+a_2+a_k-k+1} \left[ \frac{\frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{c_1-1} + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^m \left(\frac{1}{3}\right)^{c_1+c_2+\dots+c_m-m}}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^m \left(\frac{1}{3}\right)^{c_1+c_2+\dots+c_m-m}} \right]. \end{aligned}$$

Очевидно, що числа

$$A = 3^{a_1+a_2+\dots+a_k} \left[ \left(\frac{1}{3}\right)^{a_1} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{a_1+a_2-1} + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{a_1+a_2+\dots+a_k-k+1} \right],$$

$$B = 3^{a_1+a_2+\dots+a_k} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{a_1+a_2+a_k-k+1},$$

$$C = 3^{c_1+c_2+\dots+c_m} \left[ \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{c_1-1} + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^m \left(\frac{1}{3}\right)^{c_1+c_2+\dots+c_m-m} \right]$$

є натуральними.

Отже

$$\frac{1}{2} = \frac{A}{3^{a_1+a_2+\dots+a_k}} + \frac{B}{3^{a_1+a_2+\dots+a_k}} \cdot \frac{C}{3^{c_1+c_2+\dots+c_m} - 2^m},$$

звідки

$$\frac{3^{a_1+a_2+\dots+a_k} \cdot (3^{c_1+c_2+\dots+c_m} - 2^m)}{2} = A(3^{c_1+c_2+\dots+c_m} - 2^m) + BC.$$

Оскільки права частина останньої рівності — натуральне число, то вираз  $3^{a_1+a_2+\dots+a_k} \cdot (3^{c_1+c_2+\dots+c_m} - 2^m)$  має ділитись на 2. Це, очевидно, не так, а отже наше припущення невірне і число  $x = \frac{1}{2}$  має неперіодичне  $q_0^\infty$ -зображення при  $q_0 = \frac{1}{3}$ .

### 3. ГЕОМЕТРІЯ $q_0^\infty$ -ЗОБРАЖЕННЯ ЧИСЕЛ

**Означення 2.** Нехай  $(c_1, c_2, \dots, c_m)$  — впорядкований набір натуральних чисел. Циліндром рангу  $m$  з основою  $c_1 c_2 \dots c_m$  називається множина  $\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty}$  чисел  $x \in (0, 1]$ , перші  $m$  цифр  $q_0^\infty$ -зображення яких є  $c_1, c_2, \dots, c_m$  відповідно, тобто

$$\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty} = \{x : x = \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m a_{m+1} a_{m+2} \dots}^{q_0^\infty}, a_{m+i} \in \mathbb{N}, i = 1, 2, 3, \dots\}.$$

Безпосередньо з означення випливають наступні властивості циліндрів:

$$1. \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m i};$$

$$2. \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty} \subset [a; b], \text{ де}$$

$$a = q_0^{c_1} + (1 - q_0)q_0^{c_1+c_2-1} + \dots + (1 - q_0)^{m-1}q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m+2} + (1 - q_0)^m q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m+1},$$

$$b = q_0^{c_1} + (1 - q_0)q_0^{c_1+c_2-1} + \dots + (1 - q_0)^{m-1}q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m+1} + (1 - q_0)^m q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m};$$

3. Для діаметра циліндра виконується рівність

$$d(\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty}) = (1 - q_0)^m q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m}.$$

$$4. \max \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m(i+1)}^{q_0^\infty} = \inf \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m i}^{q_0^\infty}, \quad i = 1, 2, \dots;$$

5. Циліндри одного рангу не перетинаються або співпадають (рівні), причому

$$\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty} = \Delta_{c'_1 c'_2 \dots c'_m}^{q_0^\infty} \iff c_i = c'_i \quad i = \overline{1, m};$$



6. Мають місце рівності

$$\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty} \cap \Delta_{c'_1 \dots c'_m c'_{m+1} \dots c'_{m+k}}^{q_0^\infty} = \begin{cases} \emptyset, & \text{якщо } \exists i \leq m, c_i \neq c'_i, \\ \Delta_{c'_1 c'_2 \dots c'_m c'_{m+1} \dots c'_{m+k}}^{q_0^\infty}, & \text{якщо } c_i = c'_i, i = \overline{1, m}. \end{cases}$$

7. Для довільної послідовності  $(c_m) \in L$  переріз

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty} = x = \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m \dots}^{q_0^\infty}$$

є точка півінтервала  $(0; 1]$ .

**Лема 2.** Циліндр  $\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty}$  є півінтервалом  $(a; b]$ , де

$$\begin{aligned} a &= q_0^{c_1} + (1 - q_0)q_0^{c_1+c_2-1} + \dots + (1 - q_0)^{m-1}q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m+2} + (1 - q_0)^m q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m+1} \equiv \\ &\equiv \Delta_{c_1 c_2 \dots c_{m-1} (c_m+1)(1)}^{q_0^\infty}, \\ b &= q_0^{c_1} + (1 - q_0)q_0^{c_1+c_2-1} + \dots + (1 - q_0)^{m-1}q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m+1} + (1 - q_0)^m q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m} \equiv \\ &\equiv \Delta_{c_1 c_2 \dots c_{m-1} c_m(1)}^{q_0^\infty}. \end{aligned}$$

*Доведення.* Враховуючи властивість 2, залишається довести включення

$$(a; b] \subset \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty}.$$

Нехай  $x$  – будь-яке число з  $(a; b]$ , тобто  $0 < a < x \leq b \leq 1$ .

Згідно з теоремою 1 число  $x$  розкладається в ряд (3):

$$x = q_0^{a_1} + \sum_{n=1}^{\infty} (1 - q_0)^n q_0^{a_1+a_2+\dots+a_{n+1}-n}.$$

Тоді  $a_i(x) = a_i(a) = a_i(b) = c_i$  при  $i \leq m - 1$  і

$$c_m = a_m(b) \leq a_m(x) < a_m(a) = c_m + 1,$$

тобто  $a_m(x) = c_m$ , а отже,  $x \in \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty}$ . □

**Наслідок 2.** Довжина циліндра обчислюється за формулою

$$|\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty}| = (1 - q_0)^m q_0^{c_1+c_2+\dots+c_m-m}.$$

**Наслідок 3.** Має місце рівність (основне метричне відношення)

$$\frac{|\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m i}^{q_0^\infty}|}{|\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty}|} = (1 - q_0)q_0^{i-1}.$$

## 4. ОПЕРАТОР ЗСУВУ СИМВОЛІВ

У множині  $\mathcal{Z}_{(0;1]}^{q_0^\infty}$  всіх  $q_0^\infty$ -зображень дійсних чисел півінтервала  $(0; 1]$  розглянемо оператор  $\widehat{\omega}$  зсуву цифр, означений рівністю

$$\widehat{\omega}(\Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}) = \Delta_{a_2 a_3 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty},$$

який породжує функцію  $\omega : (0; 1] \rightarrow (0; 1]$ .

Даний оператор володіє властивістю сюр'єктивності, але не має властивості ін'єктивності, оскільки

$$\omega(\Delta_{i a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}) = \omega(\Delta_{j a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}) \quad \text{при } i \neq j.$$

Точки  $\Delta_{(i)}^{q_0^\infty}$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots$ , є інваріантними для відображення  $\omega$ .

$n$ -кратне застосування оператора зсуву  $\widehat{\omega}$  приводить до оператора  $\widehat{\omega}^n$ :

$$\widehat{\omega}^n(\Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}) = \Delta_{a_{n+1} a_{n+2} \dots}^{q_0^\infty}.$$

**Лема 3. 1.** Функція  $\omega(x)$  є кусково-лінійною, причому лінійною на кожному циліндрі першого рангу:

$$\omega(x) = \frac{q_0^{1-i} x - q_0}{1 - q_0}, \quad \text{якщо } x \in \Delta_i^{q_0^\infty}, \quad (6)$$

тобто  $x = \Delta_{i a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots$

2. В точці  $x = \Delta_{i(1)}^{q_0^\infty}$ ,  $i > 1$ , вона має розрив першого роду зі стрибком 1.

*Доведення.* 1. Справді,

$$x = \Delta_{i a_2 a_3 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty} = q_0^i + q_0^{i-1}(1 - q_0) \sum_{n=1}^{\infty} (1 - q_0)^n q_0^{a_2 + \dots + a_{n+1} - n},$$

тобто

$$x = q_0^i + q_0^{i-1}(1 - q_0)\omega(x),$$

звідки випливає (6).

2. Безпосередньо з означення функції  $\omega$  маємо

$$\omega(\Delta_{i(1)}^{q_0^\infty}) = \Delta_{(1)}^{q_0^\infty} = 1.$$

Дослідимо поведінку функції  $\omega(x)$  в правому  $\varepsilon$ -півоколі точки  $x = \Delta_{i(1)}^{q_0^\infty}$ . Оскільки умова  $x \rightarrow \Delta_{i(1)}^{q_0^\infty} + 0$  рівносильна умові  $x \in \Delta_{[i-1]j}^{q_0^\infty}$ , де  $j \rightarrow \infty$ , то

$$\lim_{x \rightarrow \Delta_{i(1)}^{q_0^\infty} + 0} \omega(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} \omega(\Delta_{(i-1)j(1)}^{q_0^\infty}) = \lim_{j \rightarrow \infty} \Delta_{j(1)}^{q_0^\infty} = 0. \quad \square$$

**Зауваження 3.** Всі прями, що є графіками лінійних функцій (6), мають різні кутові коефіцієнти, але вісь ординат перетинають в одній точці.

**Наслідок 4.** *Оператор зсуву символів  $\omega$  кожену підмножину півінтервала  $(0; 1]$  нульової міри Лебега переводить в множину нульової міри Лебега, а підмножину повної міри – в множину повної міри; більше того прообразом множини нульової міри є множина нульової міри, а множини повної міри – множина повної міри.*

## 5. ХВОСТОВІ МНОЖИНИ

У множині  $\mathcal{Z}_{(0,1]}^{q_0^\infty}$  всіх  $q_0^\infty$ -зображень чисел  $(0, 1]$  введемо бінарне відношення еквівалентності "мати однаковий хвіст" (символічно:  $\sim$ ).

**Означення 3.** Будемо говорити, що два  $q_0^\infty$ -зображення

$$\Delta_{\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_n\dots}^{q_0^\infty} \quad i \quad \Delta_{\beta_1\beta_2\dots\beta_n\dots}^{q_0^\infty}$$

мають однаковий хвіст, або перебувають у відношенні  $\sim$ , якщо існують натуральні числа  $m$  та  $k$  такі, що  $\alpha_{m+j} = \beta_{k+j}$  для будь-якого  $j \in \mathbb{N}$ .

Очевидно, що відношення  $\sim$  є відношенням еквівалентності (тобто має властивості рефлексивності, симетричності та транзитивності) і розбиває множину, на якій воно задане, на класи еквівалентності. Кожен з класів еквівалентності називатимемо *хвостовою множиною*. Кожна хвостова множина однозначно визначається довільним своїм елементом (представником).

Будемо говорити, що два числа  $x$  і  $y$  мають однаковий хвіст (або перебувають у відношенні  $\sim$ ), якщо їх  $q_0^\infty$ -зображення перебувають у відношенні  $\sim$ .

Символічно:  $x \sim y$ .

**Лема 4.** *Кожна хвостова множина є зліченною і щільною в  $(0, 1]$  множиною.*

*Доведення.* Нехай  $H$  — довільний клас еквівалентності,  $x_0 = \Delta_{c_1\dots c_k\dots}^{q_0^\infty}$  — його представник. Тоді очевидно, що для довільного натурального  $m$  існує множина  $H_m$  таких чисел  $x$ , що  $\alpha_{m+j}(x) = \alpha_{k+j}(x_0)$  для довільного  $j \in \mathbb{N}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ .

Тоді множина  $H = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} H_m$ , будучи зліченим об'єднанням злічених множин, є множиною зліченною.

Доведемо тепер, що множина  $H$  щільна в  $(0, 1]$ . Оскільки належність числа  $x$  до множини  $H$  не залежить від довільної скінченної кількості перших символів його  $q_0^\infty$ -зображення, то в кожному з циліндрів довільного рангу  $m$  існує точка множини  $H$ . Отже,  $H$  є всюди щільною в  $(0, 1]$  множиною. Що й вимагалось довести.  $\square$

**Теорема 3.** *Фактор-множина  $G \equiv (0, 1] / \sim$  є континуальною.*

*Доведення.* Скористаємось методом доведення від супротивного. Припустимо, що  $G$  є зліченною. Тоді, згідно з лемою 2, півінтервал  $(0, 1]$  є зліченим об'єднанням злічених множин. Але добре відомо, що остання множина є зліченною, а півінтервал  $(0, 1]$  є континуальною множиною. Отримана суперечність доводить теорему.  $\square$

**5.1. Задача Гаусса-Кузьміна для  $q_0^\infty$ -зображень чисел.** Нехай  $u = \Delta_{a_1 a_2 \dots a_k}^{q_0^\infty}$  —  $q_0^\infty$ -зображення числа  $u \in (0; 1]$ . Позначимо  $z_n(u) = \Delta_{a_{n+1} a_{n+2} \dots a_{n+k}}^{q_0^\infty}$ . Розглянемо множину

$$E_n(x) = \{u : u \in (0; 1], z_n(u) < x\}.$$

Задача Гаусса-Кузьміна полягає у визначенні границі  $\lambda[E_n(x)]$  при  $n \rightarrow \infty$ .

**Теорема 4.** *Міра Лебега множини*

$$E_n(x) = \{u : u \in [0; 1], z_n(u) < x\} \quad (7)$$

не залежить від  $n$  і дорівнює  $x$ , тобто

$$\lambda[E_n(x)] = x.$$

*Доведення.* Нехай  $\Delta_{x_1 \dots x_n}^{q_0^\infty}$  —  $q_0^\infty$ -зображення числа  $x$ , а  $\Delta_{u_1 \dots u_n}^{q_0^\infty}$  —  $q_0^\infty$ -зображення числа  $u$ .

При  $n = 0$  множина

$$E_0(x) = \{u : u \in (0; 1], z_0(u) = u < x\}$$

містить ті і тільки ті точки  $(0; 1]$ , які менші  $x$ . Тому  $\lambda[E_0(x)] = x$ .

При  $n = 1$  належінсть точки  $u$  множині

$$E_1(x) = \{u : u \in (0, 1], z_1(u) = \Delta_{u_2 \dots u_n}^{q_0^\infty} < x\}$$

не залежить від її першого  $q_0^\infty$ -символа. Більше того,

$$\bar{u} = \Delta_{a_1 u_1 \dots u_n}^{q_0^\infty} \in E_1 \quad \Leftrightarrow \quad u = \Delta_{u_1 \dots u_n}^{q_0^\infty} \in E_0$$

і

$$z_1(u) < x \quad \Leftrightarrow \quad \bar{u} < \bar{x} = \Delta_{a_1 x_1 \dots x_n}^{q_0^\infty}.$$

Тому

$$E_1(x) = \bigcup_{c=1}^{\infty} [\Delta_c^{q_0^\infty} \cap E_1(x)] \quad \text{і} \quad E_0(x) \stackrel{(1-q_0)q_0^{c-1}}{\sim} [\Delta_c^{q_0^\infty} \cap E_1(x)].$$

Звідки

$$\lambda[E_1(x)] = \sum_{c=1}^{\infty} \lambda[\Delta_c^{q_0^\infty} \cap E_1(x)] = \sum_{c=1}^{\infty} (1 - q_0) q_0^{c-1} \lambda[E_0(x)] = \lambda[E_0(x)] \sum_{c=1}^{\infty} (1 - q_0) q_0^{c-1} = x.$$

Аналогічно

$$E_n(x) = \bigcup_{c_1=1}^{\infty} \dots \bigcup_{c_n=1}^{\infty} [\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0^\infty} \cap E_n(x)]$$

і

$$E_0(x) \stackrel{k}{\sim} [\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0^\infty} \cap E_n(x)], \quad \text{де } k = (1 - q_0)^n q_0^{c_1 + \dots + c_n - n}.$$

Тому

$$\begin{aligned} \lambda[E_n(x)] &= \sum_{c_1=1}^{\infty} \dots \sum_{c_n=1}^{\infty} \lambda[\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0^\infty} \cap E_n(x)] = \\ &= \lambda[E_0(x)] \sum_{c_1=1}^{\infty} \dots \sum_{c_n=1}^{\infty} (1 - q_0)^n q_0^{c_1 + \dots + c_n - n} = \lambda[E_0(x)] = x. \end{aligned}$$

□

## 6. МЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ

Метрична теорія дійсних чисел займається задачами про міру Жордана, Лебега та ін. множин дійсних чисел, що володіють певною властивістю, зокрема, визначених умовами на вживання символів (цифр) у зображенні числа в тій чи іншій системі, а також розв'язанням теоретико-числових проблем з використанням засобів теорії міри.

**Лема 5.** *Для міри Лебега виконуються наступні співвідношення:*

$$\lambda \left( \bigcup_{i=k+1}^{\infty} \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) = (1 - q_0)^m q_0^{c_1 + \dots + c_m + k - m}; \quad (8)$$

$$\lambda \left( \bigcup_{i=1}^k \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) = (1 - q_0)^m q_0^{c_1 + \dots + c_m - m} (1 - q_0^k); \quad (9)$$

$$\lambda \left( \bigcup_{i=k+1}^n \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) = (1 - q_0)^m q_0^{c_1 + \dots + c_m + k - m} (1 - q_0^{n-k}). \quad (10)$$

*Доведення.* Використовуючи наслідок 1 леми 2 та властивості міри Лебега, отримуємо:

$$\begin{aligned} \lambda \left( \bigcup_{i=k+1}^{\infty} \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) &= \sum_{i=k+1}^{\infty} \lambda(\Delta_{c_1 \dots c_m i}) = \\ &= \sum_{i=k+1}^{\infty} (1 - q_0)^{m+1} q_0^{c_1 + \dots + c_m + i - m - 1} = (1 - q_0)^m q_0^{c_1 + \dots + c_m + k - m}; \\ \lambda \left( \bigcup_{i=1}^k \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) &= \sum_{i=1}^k \lambda(\Delta_{c_1 \dots c_m i}) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=1}^k (1 - q_0)^{m+1} q_0^{c_1 + \dots + c_m + i - m - 1} = (1 - q_0)^m q_0^{c_1 + \dots + c_m - m} (1 - q_0^k); \\
 &\quad \lambda \left( \bigcup_{i=k+1}^n \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) = \sum_{i=k+1}^n \lambda(\Delta_{c_1 \dots c_m i}) = \\
 &= \sum_{i=k+1}^n (1 - q_0)^{m+1} q_0^{c_1 + \dots + c_m + i - m - 1} = (1 - q_0)^m q_0^{c_1 + \dots + c_m + k - m} (1 - q_0^{n-k}).
 \end{aligned}$$

□

### Теорема 5. Множина

$$C = C[q_0^\infty, (V_n)] = \{x : x = \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n}^{q_0^\infty}, a_n(x) \in V_n \subseteq \mathbb{N}\} \quad \epsilon:$$

1. об'єднанням півінтервалів, якщо  $V_n = \mathbb{N}$  для всіх  $n$ , більших деякого  $n_0$ ;
2. ніде не щільною множиною, якщо нерівність  $V_n \neq \mathbb{N}$  виконується нескінченну кількість разів;
3. міра Лебега множини  $C$  обчислюється за формулою

$$\lambda(C) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda(F_{k+1})}{\lambda(F_k)} = \prod_{k=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{\lambda(\overline{F}_{k+1})}{\lambda(F_k)} \right),$$

$$\text{де } F_0 = (0; 1], F_k = \bigcup_{c_1 \in V_1} \dots \bigcup_{c_{k-1} \in V_{k-1}} \bigcup_{i \in V} \Delta_{c_1 \dots c_{k-1} i}, \overline{F}_{k+1} = F_k \setminus F_{k+1}.$$

*Доведення.* 1. Очевидно, що при  $V_n = \mathbb{N}$  для всіх  $n \in \mathbb{N}$   $C = (0; 1]$ .

Якщо  $V_n = \mathbb{N}$  для  $n > n_0$ , то

$$C \ni x = q_0^{a_1} + (1 - q_0)q_0^{a_1 + a_2 - 1} + \dots + (1 - q_0)^{n_0 - 1} q_0^{a_1 + \dots + a_{n_0} - n_0 + 1} + (1 - q_0)^{n_0} q_0^{a_1 + \dots + a_{n_0} - n_0} x_1,$$

де

$$x_1 = q_0^{a_{n_0+1}} + (1 - q_0)q_0^{a_{n_0+1} + a_{n_0+2} - 1} + \dots \quad (11)$$

Множина всіх

$$\tilde{x} = (1 - q_0)^{n_0} q_0^{a_1 + \dots + a_{n_0} - n_0} x_1,$$

де  $(a_{n_0+k})$  – пробігає множину всіх послідовностей натуральних чисел, є циліндром першого рангу з основою  $a = a_1 + a_2 + \dots + a_{n_0}$ .

Тому

$$C = \bigcup_b [b \oplus \Delta_a^{q_0^\infty}],$$

де  $b = q_0^{a_1} + (1 - q_0)q_0^{a_1 + a_2 - 1} + \dots + (1 - q_0)^{n_0 - 1} q_0^{a_1 + \dots + a_{n_0} - n_0 + 1}$ , а  $(a_1, a_2, \dots, a_{n_0-1})$  – пробігає  $\underbrace{\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{n_0-1}$ , що і вимагалось довести.

2. Скористаємось означенням ніде не щільної множини, а саме: покажемо, що в будь-якому інтервалі  $(c; d)$  існує підінтервал  $(c'; d')$ , що не містить точок множини  $C$ .

Нехай  $c = \Delta_{c_1 c_2 \dots c_n \dots}^{q_0^\infty}$  і  $d = \Delta_{d_1 d_2 \dots d_n \dots}^{q_0^\infty}$ . Оскільки  $c < d$ , то існує  $m$  таке, що

$$c_m > d_m \quad \text{і} \quad c_j = d_j \quad \text{при} \quad j < m.$$

Таким інтервалом  $(c'; d')$  є

$$(c'; d') = \nabla_{d_1 d_2 \dots d_m (d_{m+1}+1) \underbrace{1 \dots 1}_k j},$$

де  $k$  таке, що  $V_{m+k+2} \neq \mathbb{N}$  і  $j = \mathbb{N} \setminus V_{m+k+2}$ .

Справді цей інтервал лежить правіше  $c$ , бо  $c_m > d_m$  і лівіше  $d$ , бо  $d_{m+1} + 1 > d_{m+1}$ .  $A$  не містить він точок множини  $C$ , бо  $j \in \bar{V} = \mathbb{N} \setminus V$ .

3. Оскільки  $F_k$  – це об'єднання циліндрів рангу  $k$ , серед внутрішніх точок яких є точки множини  $C$ , то  $C \subset F_{k+1} \subset F_k$  для всіх  $k \in \mathbb{N}$  і більше того,

$$C = \lim_{k \rightarrow \infty} F_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \quad \text{і} \quad \lambda(C) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda(F_k).$$

Тому з рівності  $F_{k+1} = F_k \setminus \bar{F}_{k+1}$  маємо  $\lambda(F_k) = \lambda(F_{k-1}) - \lambda(\bar{F}_k)$ . Звідки

$$\lambda(F_k) = \prod_{i=1}^k \frac{\lambda(F_i)}{\lambda(F_{i-1})} = \prod_{i=1}^k \frac{\lambda(F_{i-1}) - \lambda(\bar{F}_i)}{\lambda(F_{i-1})} = \prod_{i=1}^k \left( 1 - \frac{\lambda(\bar{F}_i)}{\lambda(F_{i-1})} \right).$$

А отже,

$$\lambda(C) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda(F_k) = \prod_{i=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{\lambda(\bar{F}_i)}{\lambda(F_{i-1})} \right). \quad \square$$

**Наслідок 5.** Міра Лебега множини  $C[q_0^\infty, (V_n)]$  дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли розбігається ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda(\bar{F}_{k+1})}{\lambda(F_k)}.$$

**Наслідок 6.** Якщо послідовність множин  $(V_n)$  є сталою, а саме  $V_n = V \neq \mathbb{N}$ , то множина  $C[q_0^\infty, \{V_n\}]$  є множиною нульової міри Лебега.

**Теорема 6.** Нехай  $c$  і  $s$  – фіксовані натуральні числа. Множина

$$D \equiv D[q_0^\infty, \bar{c}s] = \{x : x = \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}, \quad \text{де} \quad \overline{a_n a_{n+1}} \neq \bar{c}s \quad \forall n \in \mathbb{N}\}$$

є ніде не щільною множиною нульової міри Лебега.

*Доведення.* Скористаємось означенням ніде не щільної множини, а саме: покажемо, що в будь-якому інтервалі  $(a; b)$  існує підінтервал  $(a'; b')$ , що не містить точок множини  $D$ .

Нехай  $a = \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}^{q_0^\infty}$  і  $b = \Delta_{b_1 b_2 \dots b_n \dots}^{q_0^\infty}$ . Оскільки  $a < b$ , то існує  $m$  таке, що

$$a_m > b_m \quad \text{і} \quad a_j = b_j \quad \text{при} \quad j < m.$$

Нехай  $a' = \Delta_{b_1 \dots b_{m-1}(b_m+1)b_{m+1}b_{m+2} \dots}^{q_0^\infty}$  і  $b' = \Delta_{b_1 \dots b_{m-1}b_m(b_{m+1}+1)b_{m+2} \dots}^{q_0^\infty}$ . Очевидно, що інтервал  $(a'; b')$  міститься в  $(a; b)$  і не містить точок множини  $D$ .

З означення множини  $D$  та циліндричних відрізків маємо:

$$D \subset \left( \bigcup_{a_1 \neq c} \Delta_{a_1}^{q_0^\infty} \right) \cup \left( \bigcup_{a_2 \neq s} \Delta_{ca_2}^{q_0^\infty} \right).$$

Звідки, враховуючи властивості міри Лебега, отримуємо:

$$\begin{aligned} \lambda(D) &\leq \lambda(D) \sum_{i:i \neq c} |\Delta_i^{q_0^\infty}| + \lambda(D) \sum_{i:i \neq s} |\Delta_{ci}^{q_0^\infty}| = \\ &= (1 - (1 - q_0)q_0^{c-1})\lambda(D) + ((1 - q_0)^{c-1} - (1 - q_0)^2 q_0^{c+s-2})\lambda(D) = \\ &= \lambda(D) - (1 - q_0)^2 q_0^{c+s-2} \lambda(D), \end{aligned}$$

що, очевидно, можливо тільки при  $\lambda(D) = 0$ . □

**Теорема 7.** Множина чисел півінтервалу  $(0; 1]$  з обмеженими символами  $q_0^\infty$ -зображень є множиною нульової міри Лебега.

*Доведення.* Позначимо через  $E_M$  множину чисел півінтервала  $(0, 1]$ , всі  $q_0^\infty$ -символи яких менші за  $M$ . Нехай  $\Delta_{c_1 c_2 \dots c_n}$  — довільний циліндр рангу  $n$ , такий, що

$$c_k < M, \quad k = \overline{1, n}. \quad (12)$$

Точки  $x$  цього циліндра, які задовольняють додаткову умову  $c_{n+1}(x) = k$ , утворюють інтервал  $\nabla_{c_1 c_2 \dots c_n k}$  рангу  $n + 1$ . В силу основного метричного відношення (наслідок 3)  $|\Delta_{c_1 \dots c_n k}^{q_0}| = (1 - q_0)q_0^{k-1} |\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0}|$ , звідки

$$\lambda \left( \bigcup_{k \geq M} \Delta_{c_1 \dots c_n k}^{q_0} \right) = |\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0}| \sum_{k \geq M} (1 - q_0)q_0^{k-1} = |\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0}| \sum_{i=0}^{\infty} (1 - q_0)q_0^{M+i} = |\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0}| q_0^M.$$

Оскільки  $\bigcup_{k=1}^{\infty} \Delta_{c_1 \dots c_n k}^{q_0} = \Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0}$ , то

$$\bigcup_{k < M} |\Delta_{c_1 \dots c_n k}^{q_0}| = (1 - q_0^M) |\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0}|. \quad (13)$$

Позначивши через  $E_M^{(n)}$  множину чисел півінтервала  $(0, 1]$ , які задовольняють умові (12), з нерівності (13) бачимо, що частина множини  $E_M^{(n+1)}$ , яка міститься в деякому циліндрі  $\Delta_{c_1 c_2 \dots c_n}^{q_0}$  рангу  $n$ , має міру  $(1 - q_0^M) |\Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0}|$ . Сумуючи нерівність (12) по всім циліндрам рангу  $n$ , які входять в множину  $E_M^{(n)}$ , отримаємо:  $\lambda \left( E_M^{(n+1)} \right) = (1 - q_0^M) \lambda \left( E_M^{(n)} \right)$ . Послідовне застосування цієї нерівності, очевидно, дає  $\lambda \left( E_M^{(n+1)} \right) = (1 - q_0^M)^n \lambda \left( E_M^{(1)} \right)$  ( $n \geq 1$ ), звідки  $\lambda \left( E_M^{(n)} \right) \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), оскільки  $(1 - q_0^M) < 1$ . Але



визначена нами вище множина  $E_M$ , очевидно, міститься в кожній з множин  $E_M^{(n)}$ , внаслідок чого  $\lambda(E_M) = 0$ .

Покладаючи тепер  $\bigcup_{M=1}^{\infty} E_M = E$ , отримаємо  $\lambda(E) \leq \sum_{M=1}^{\infty} \lambda(E_M) = 0$ . Але кожне число з обмеженими елементами належить, очевидно, множині  $E_M$  при достатньо великому  $M$ , а значить, належить множині  $E$ .  $\square$

### 7. $q_0^\infty$ -циліндри І ФРАКТАЛЬНА РОЗМІРНІСТЬ ХАУСДОРФА-БЕЗИКОВИЧА

Оскільки  $q_0^\infty$ -циліндри є  $Q_2$ -циліндрами рангу  $c_1 + c_2 + \dots + c_m$ , а саме:

$$\Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^{q_0^\infty} = \Delta_{\underbrace{0 \dots 0}_{c_1-1} \underbrace{1 \dots 0}_{c_2-1} \dots \underbrace{0 \dots 0}_{c_m-1} 1},$$

то згідно з ?? при визначенні (обчисленні) фрактальної розмірності Хаусдорфа-Безиковича можна обмежитись  $Q_2$ -циліндрами.

#### Теорема 8. Множина

$$C \equiv C[q_0^\infty, V] = \{x : x = \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n}^{q_0^\infty}, a_n \in V \neq \mathbb{N}\}$$

є самоподібною, якщо  $V$  скінченна, і  $N$ -самоподібною, якщо  $V$  нескінченна, самоподібна і фрактальна розмірність Хаусдорфа-Безиковича якої є розв'язком рівняння

$$\sum_{v \in V} ((1 - q_0) q_0^{v-1})^x = 1.$$

*Доведення.* Позначимо  $\hat{\Delta}_{c_1 \dots c_n}^{q_0^\infty} = \Delta_{c_1 \dots c_n}^{q_0^\infty} \cap C$ . Очевидно, що

$$\begin{cases} C \subset \bigcup_{v \in V} \hat{\Delta}_v^{q_0^\infty}, \\ \hat{\Delta}_v^{q_0^\infty} \stackrel{(1-q_0)q_0^{v-1}}{\sim} C. \end{cases}$$

Звідки, а також з означень самоподібної та  $N$ -самоподібної множини, самоподібної та  $N$ -самоподібної розмірності і того факту, що вони співпадають з розмірністю Хаусдорфа-Безиковича, випливає твердження теореми.  $\square$

**Наслідок 7.** Множина  $C \equiv C[q_0^\infty, V]$  є інваріантною відносно оператора зсуву символів.

### 8. САМОПОДІБНІ МНОЖИНИ ЧИСЕЛ ТИПУ БЕЗИКОВИЧА-ЕГГЛСТОНА

Нехай  $N_i(x, n)$  – кількість цифр  $i$  у  $q_0^\infty$ -зображенні числа  $x$  до  $n$ -го місця включно, тобто

$$N_i(x, n) = \#\{j : a_j(x) = i, j \leq n\}.$$

Якщо існує границя

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_i(x, n)}{n} \equiv \nu_i(x),$$

то вона називається *частотою* цифри  $i$  у  $q_0^\infty$ -зображенні числа  $x$ .

Коректність означення частоти є наслідком єдиності  $q_0^\infty$ -зображення числа. Легко навести приклад числа, у якого відсутня частота принаймні однієї цифри. Наприклад, число

$$x = \Delta_{11}^{q_0^\infty} \underbrace{23}_{2} \underbrace{1111}_{4} \underbrace{45671}_{4} \dots \underbrace{18}_{8} \dots \underbrace{15}_{8} \dots$$

не має частоти цифри 1, але має частоти рівні 0 всіх інших цифр.

### Теорема 9. Множина

$$E \equiv E[q_0^\infty; \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n, \dots] = \{x : \nu_i(x) = \tau_i, \quad i \in \mathbb{N}\}$$

є всюди щільною самоподібною множиною, розмірність Хаусдорфа-Безиковича якої обчислюється за формулою

$$\alpha_0(E[q_0^\infty, \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n, \dots]) = \frac{\ln \tau_1^{\tau_1} \tau_2^{\tau_2} \dots \tau_n^{\tau_n} \dots}{\ln(1 - q_0) q_0^{\tau_1 + 2\tau_2 + \dots + n\tau_n + \dots - 1}}. \quad (14)$$

*Доведення.* Всюди щільність і самоподібність множини  $E$  випливає з того, що належність точки  $x$  до множини  $E$  не залежить від довільного скінченного числа її перших  $q_0^\infty$ -символів і існують точки з відсутньою частотою принаймні одного символа.

При визначенні розмірності Хаусдорфа-Безиковича множини  $E$ , можна скористатись теоремою Біллінгслі: якщо  $\mu_1$  і  $\mu_2$  — неперервні ймовірнісні міри і

$$E \subset E_0 = \left\{ x : \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln \mu_1(\Delta_{c_1(x) \dots c_m(x)}^{q_0^\infty})}{\ln \mu_2(\Delta_{c_1(x) \dots c_m(x)}^{q_0^\infty})} = \delta \right\},$$

то  $\alpha_{\mu_2}(E) = \delta \alpha_{\mu_1}(E)$ .

Для цього візьмемо в якості міри  $\mu_2$  — міру Лебега, а в якості  $\mu_1$  — ймовірнісну міру на борелівських множинах  $[0; 1]$ , відносно якої  $\{c_i(x)\}$  є послідовністю незалежних випадкових величин з розподілами  $\mu_1\{x : c_k(x) = i\} = \tau_i, i \in N$ .

Тоді

$$\begin{aligned} \mu_1(\Delta_{c_1(x)c_2(x)\dots c_k(x)}^{q_0^\infty}) &= \tau_1^{N_1(x,k)} \cdot \tau_2^{N_2(x,k)} \cdot \dots \cdot \tau_m^{N_m(x,k)} \cdot \dots, \\ \lambda(\Delta_{c_1(x)c_2(x)\dots c_k(x)}^{q_0^\infty}) &= (1 - q_0)^k q_0^{c_1(x) + \dots + c_k(x) - k} = \\ &= \frac{(1 - q_0)^k}{q_0^k} \cdot q_0^{N_1(x,k) + 2N_2(x,k) + \dots + mN_m(x,k) + \dots}. \end{aligned}$$

Оскільки

$$\delta = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln \mu_1(\Delta_{c_1(x)c_2(x)\dots c_k(x)}^{q_0^\infty})}{\ln \lambda(\Delta_{c_1(x)c_2(x)\dots c_k(x)}^{q_0^\infty})} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln \tau_1^{\frac{N_1(x,k)}{k}} \cdot \tau_2^{\frac{N_2(x,k)}{k}} \cdot \dots \cdot \tau_m^{\frac{N_m(x,k)}{k}} \cdot \dots}{\ln(1 - q_0) q_0^{\frac{N_1(x,k)}{k} + \frac{2N_2(x,k)}{k} + \dots + \frac{mN_m(x,k)}{k} + \dots - 1}} =$$

$$= \frac{\ln \tau_1^{\tau_1} \tau_2^{\tau_2} \dots \tau_m^{\tau_m} \dots}{\ln(1 - q_0) q_0^{\tau_1 + 2\tau_2 + \dots + m\tau_m + \dots - 1}},$$

і за посиленням законом великих чисел  $E$  має  $\mu_1$ -міру рівну 1, тобто  $\alpha_{\mu_1}(E) = 1$ , то, згідно з теоремою Біллінгслі, має місце рівність (14).  $\square$

#### ЛІТЕРАТУРА

- [1] *Гетьман Б. І., Працьовитий М. В., Барановський О. М.* Про властивості однієї сім'ї множин канторівського типу, що визначається умовами на елементи розкладу в ряд Енгеля // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – 2010. – № 11. – С. 97-118.
- [2] *Дмитренко С. О., Кюрчев Д. В., Працьовитий М. В.* Ланцюгове  $A_2$ -зображення дійсних чисел // Український математичний журнал. – 2009. – том 61. – № 4. – С. 452-463.
- [3] *Жижарева Ю. І., Працьовитий М. В.* Зображення чисел знакододатними рядами Люрота: основи тополого-метричної, фрактальної і ймовірнісної теорій // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – 2008. – № 9. – С. 200-211.
- [4] *Колмогоров А.М., Фомін С.В.* Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. – К.: Вища шк., 1974. – 456 с.
- [5] *Постников А.Г.* Вероятностная теория чисел. М. : Знание, 1974. – 64 с.
- [6] *Працьовитий М. В., Задніпряний М. В.* Геометрія і основи метричної теорії зображення дійсних чисел рядами Сільвестера // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. –
- [7] *Працьовитий М. В.* Геометрія класичного двійкового зображення дійсних чисел. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – 68 с.
- [8] *Працьовита І. М., Задніпряний М. В.* Розклади чисел в ряди Сільвестера та їх застосування // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – 2009. – № 10. – С. 73-87.
- [9] *Працьовитий М. В.* Фрактальний підхід у дослідженнях сингулярних розподілів. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 1998. – 296 с.
- [10] *Турбин А. Ф., Працевитий Н. В.* Фрактальные множества, функции, распределения. К. : Наукова думка, 1992. – 208 с.
- [11] *Kakutani S.* Equivalence of infinite product measures // Ann. of Math. – 1948. – Vol. 49. – P. 214-224.
- [12] *Pratsiovytyi M.* Geometry of numbers in the representation systems with infinite alphabet is a basis of topological, metric, fractal, and probabilistic theories // International Conference on Algebra dedicated to 100th anniversary of S.M. Chernikov. Kyiv, Ukraine, August 20-26, 2012 / Book of abstracts. – P. 118.
- [13] *Pratsiovytyi M., Kyurchev D.* Properties of the random variable defined by  $A_2$ -continued fraction with independent elements // Random operators and stochastic equations. – 2009. – Volume 17. – Number 1. – P. 91-101.
- [14] *Zhykharyeva Y., Pratsiovytyi M.* Expansions of numbers in positive Luroth series and their applications to metric, probabilistic and fractal theories of numbers // Algebra and Discrete Mathematics. – 2012. – Volume 14. – Number 1. – P. 145-160.